



Salmo-mix

Указание:

Салмонелоза, Колибацилоза (потене) и бактериални инфекции, често срещана при птиците.

Симптоми:

ОБЩИ СИМПТОМИ НА БАКТЕРИАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ :

- очевидни промени в поведението и външния вид • разръфано оперение
- диария • необичайно и затруднено дишане • загуба на апетит

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СИМПТОМИ НА КОЛИБАЦИЛОЗА

- вътрешната част на гнездата, оцветени с жълта диария • малките са зашеметени • повишена смъртност през първите няколко дни от живота

Салмонелозата е по-често срещана в по-влажните периоди от годината, при външни волиери, когато не се вземат правилни хигиенни мерки, наличието на мишки или диви птици могат да бъдат източник на инфекция.

Дозировка

Дозировка за нормално лечение:

добавете доза от 5 гр. на 1 л. питейна вода в продължение на 5 - 7 последователни дни.

В случай на Салмонелоза, Колибацилоза (потене), повторете лечението след 2 дни. Включена е мерителна лъжичка 1 + 5 гр.



Взаимодействие(я): непознати. **Противопоказание(я):** предозиране:

Съвети за употреба:

Изолirайте болната птица (при температура 28-33 градуса при приглушена светлина)
Да се съхранява на сухо, далеч от пряка слънчева светлина място, между 0-30 градуса Целзий
Докато лекувате болни животни, осигурете превантивно лечение и на други птици.
Уверете се, че птиците вземат препоръчителните количества лекарства, затова избягвайте прием на храна или вода без медикаменти
Включете глюкоза и Multivit Mix по време на лечението.
За по-сериозни състояния, се препоръчва продължително лечение. Уверете се, че мястото на лечение е добре обеззаразено.
Ако не се наблюдава бързо подобрение, консултирайте се с експерт.

Забележка: Прочетете инструкциите преди употреба.

Да се съхранява на сухо, далеч от пряка слънчева светлина място, между 0-30 градуса Целзий
Срок на годност след първоначалното отваряне : 1 година.
Партиден номер и срок на годност : виж опаковката
Да се избягва контакт на лекарството с ръцете ви.
Дръжте далеч от деца.
Само за лечение на животни. Не е за животни, предназначени да произвеждат храна за човешка консумация.
Изхвърлете празните опаковки и остатъчния продукт в битовите отпадъци.
Това лекарство се използва за ветеринарни цели и се предлага на пазара със схема съобразена за малки животни.

Съдържание:

Фураптадон хидрохлорид 12,8 % , Хлорамфеникол 8% , Хлортетрациклин хидрохлорид 12,5 % , неактивни съставки 100 гр.

