



Fungi Stop

Pilzinfektionen (aspergillus/candida) bei den Tauben. Sie sind von Bedeutung, da einige Pilze sich beim Getreide entwickeln. Die schlechte Hygiene kann auch die Hefepilze verbreiten. Die meisten gesunden Tauben werden nicht betroffen, die älteren, kranken und gestressten Vögel entwickeln Pilzinfektionen. Diese sekundären Infektionen belasten das Immunsystem und stören die Genesung.

Symptome

Die Vögel blähen sich auf / sie strecken die Federn heraus/, Appetitlosigkeit, Erbrechen, aufgeblähter Hals, Atembeschwerden, oft kombiniert mit Durchfall.

Dosierung

Nahrungsdosis: Bei den Vögeln als Ganzes:

5g/ 500g Von der Nahrung, zweimal am Tag, 5 bis 7 Tage.

Wasserdosis: Bei den Vögeln als Ganzes: 5g/ 1L. Wasser, zweimal am Tag, 5 bis 7 Tage.

Vor Gebrauch gut rühren!

Vorbeugend: Geben Sie Ihrem Vogel Zitronensäure 5 ml pro 1L Wasser am Tag.

Zusammensetzung: 200.000 i.u. Nystatine per gram.

Inactive ingredients q.s. to 100 g.

100 g PULVER

Dosierung

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Ketoconazole 75 mg/g

50 TABLETTEN