

# Ronidazole

## Canker (Trichomoniasis, Hexamitiasis)

Ronidazole 10% ist ein Produkt, besonders effektiv bei Infektionen, verursacht von Trichomoniasis und Hexamitiasis bei den Tauben. Während der Wettbewerbszeit sind die regelmäßigen Behandlungen dieser Infektionen als Pflicht gefragt. Die jungen Vögel mit problematischem Darmtrakt, verursacht durch Hexamiten sind empfindlicher zu den unangenehmen Infektionen, verursacht von E-coli. Mit einer Sicherheitsgrenze wird sogar bei den jungen Vögeln gerechnet.

### Symptome

Mangel an Wohlbefinden, Verdauungsstörungen, schlechte Stühle. Der Halsentzündung der Halsschleimhaut, kleine weiße bis gelbliche Stellen in der Mundhöhle.

#### Dosierung

**Vorbeugend:** 2 Messlöffel (=2g) pro 1 Wasser) im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, am besten beginnt man damit nach dem Tag des Wettbewerbs.

**Heilung:** während der Wettbewerbszeit: 2 Messlöffel (=2g) pro 1 Wasser, im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Diese Arznei kann bei Notwendigkeit nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

**Zusammensetzung:** Ronidazole 10%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

#### 100 g PULVER



#### Dosierung

**Vorbeugend:** 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

**Heilung:** 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

#### 50 TABLETTEN