



Orni Super Mix **Extra Strong**

Ornithose, Mycoplasmen, Atmungsprobleme und Canker.

Symptoms

Ziehen der Gefiedern, Kratzen am Kopf, roter Hals, Gähnen, entzündetes drittes Lid (besonders bei jungen Tauben), schmutzige Nasen, blaues Fleisch, geschwollene Köpfe, ein Auge ist kalt, feuchte Augen, Nasenschleim.

Dosierung

Vorbeugend: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser) im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, Empfohlen wird nach dem Wettkampftag zu beginnen.

Heilung: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser) im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Wenn nötig, kann dieses Arzneimittel nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

Zusammensetzung: Doxycycline Hydiate 6%, Spiramycin Adipate 10%, Metronidazole 10%, Bromhexine HCl 2%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

100 g PULVER

Dosierung

Preventive: 1 tablet per pigeon (400-500 g bodyweight) for 1-2 consecutive days.

Curative: 1 tablet per pigeon (400-500 g bodyweight) for 3-5 consecutive days, or as Vet. prescribes.

50 TABLETTEN

Zusammensetzung: Doxycycline Hydiate 102 mg/g ; Spiramycin Adipate 80 mg/g ; Metronidazole 100 mg/g ; Bromhexine HCl 20 mg/g