



Fungi Stop

Η σπουδαιότητα για τα εκτρεφόμενα περιστέρια είναι ότι μερικά είδη μυκήτων αναπτύσσονται σιτηρά. Η κακή υγιεινή μπορεί επίσης να προκαλέσει εξαπλώση της μόλυνσης. Τα πιο υγιή πτηνά δε πρόκειται να επηρεαστούν (γρηαία, άρρωστα, και αγχώδη πτηνά αναπτύσσουν τέτοιου είδους λοιμώξεις). Οι παραπάνω λοιμώξεις προκαλούν στρες στο ήδη επιβαρυνμένο ανοσοποιητικό σύστημα και παρεμβαίνουν στη θεραπευτική διαδικασία.

Συμπτώματα: Πτώση φτερών, απώλεια όρεξης, εμετός, δυσκολία αναπνοής, διάρροια, πρησμένη καλλιέργεια.

Δοσολογία

Δόση τροφής: Γενικά στα πουλιά: 5 g / 500 g τροφής, 2 φορές ημερησίως για 5 έως 7 ημέρες.

Δόση για πόσιμο νερό: Γενικά στα πουλιά: 5 g/1 λίτρο πόσιμου νερού, 2 φορές ημερησίως για 5 έως 7 ημέρες.

Προληπτικά: Χορηγείστε στα πουλιά 5 ml ανά 1 λίτρο πόσιμου νερού καθημερινά.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση!

Περιέχει: 200.000 i.u. Nystatine per gram. Inactive ingredients q.s. to 100 g.

100 g ΣΚΟΝΗ

Δοσολογία

Ως θεραπεία: 1 δισκίο ανά περιστέρι (400-500 g σωματικού βάρους) για 3-5 διαδοχικές ημέρες ή όπως ορίζει η συνταγή γιατρού.

Περιέχει: Ketoconazole 75 mg/g

50 τμχ. ΔΙΣΚΙΑ