

# Ronidazole

*Καρκίνωμα (Trichomoniasis, Hexamitiasis)*

Η Ροδιναζόλη 10% είναι ένα προϊόν ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια των λοιμώξεων που προκαλούνται από τριχομονάδα και hexamites στα περιστερία. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, απαραίτητες είναι οι τακτικές θεραπείες για τις συγκεκριμένες λοιμώξεις. Πτηνά νεαρής ηλικίας με σοβαρές εντερικές λοιμώξεις που προκαλούνται από hexaminates είναι περισσότερο επιρρεπή σε μια ανεπιθύμητη λοίμωξη από E-Coli. Το περιθώριο ασφάλειας είναι αξιόλογο ,συμπεριλαμβανομένων των νεαρών ζώων.

## Συμπτώματα

Απώλεια κατάστασης, κακή πέψη, δυσάρεστα περιττώματα, φλεγμονή της βλεννογόνου καλλιέργειας, επιπλοκές στην ορνιθοσίσωση, μικρές λευκές έως κίτρινες περιοχές στη στοματική κοιλότητα



### 100 g ΣΚΟΝΗ

#### Δοσολογία

**Πρόληψη:** 2 μετρημένες κουταλιές (=2g) για 1 λίτρο πόσιμου νερού κατά τη διάρκεια 1 ή 2 ημέρες κάθε 2 εβδομάδες, κατά προτίμηση στην αρχή της μέρας μετά τον αγώνα.

**Ως θεραπεία: κατά την αγωνιστική περίοδο:** 2 μετρημένες κουταλιές (=5g) για 2 λίτρα πόσιμου νερού, κατά τη διάρκεια 5-7 διαδοχικών ημερών. Η θεραπεία ενδέχεται να επαναληφθεί εάν κριθεί απαραίτητο μετά από μερικές μέρες.

**Περιέχει:** Ronidazole 10%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

### 50 τμχ. ΔΙΣΚΙΑ

#### Δοσολογία

**Προληπτικά:** 1 δισκίο ανά περιστερί ( 400-500 g σωματικού βάρους) για 1-2 διαδοχικές ημέρες.

**Ως θεραπεία:** 1 δισκίο ανά περιστερί ( 400-500 g σωματικού βάρους) για 3-5 διαδοχικές ημέρες ή όπως ορίζει η συνταγή γιατρού.

**Περιέχει:** Ronidazole 150 mg/g