



Fungi Stop

Javallat:

A gombák a rosszul tárolt takarmányban, vagy alomanyagon szaporodnak el, elsősorban akkor, ha a takarmányt nedvesség éri, majd meleg környezetben tárolják. Galambokban a gombák (penész gombák, sarjadzó gombák) közvetlenül a szervezetbe jutva, vagy az általuk termelt mérgeken, a gombatoxinokon keresztül okozhatnak betegséget. Sok gombafaj okozhat megbetegedést, és az okozott tünetek is változatosak, mivel megtámadják a tüdőt, a légzsákokat, az idegrendszert, a vesét.

Tünetek:

Borzolt tollazat, csökkent étvágy, hányás, duzzadt begy, légzési nehézségek, gyakori hasmenés.

Adagolás:

Takarmányra: madarak általános adagja: 5 g / 500 g takarmányra, naponta kétszer, 5-7 napig
Ivóvízbe: madarak általános adagja: 5 g / 1 liter ivóvíz, naponta kétszer, 5-7 napig.

Használat előtt alaposan keverje meg!

A megelőzés érdekében napi 1 liter ivóvízben biztosítson 5 ml citromsavat. Mérőkanál 1 + 5 g.

Hatóanyag: 200.000 i.u. Nisztatin / g. Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

100 g POR

Adagolás:

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400–500 g testtömeg) 3–5 egymást követő napon, vagy ahogyan állatorvos előírja.

Hatóanyag: Ketokonazol 75 mg / g

50 TABLETTA