



Fungi Stop

Zakażenia grzybicze (aspergillus/candida) u gołębi. Znaczenie przy amatorskich gołębiach polega na tym, że niektóre gatunki grzybów rosną na zbożach. Niskipoziom higieny może również rozprzestrzenić drożdże. Większość zdrowych gołębi nie zostanie dotknięta, starsze, chore i zestresowane ptaki zwykle rozwijają infekcje drożdżakowe. Te drugorzędne infekcje stresują i przeciążają układy odpornościowe i przeszkadzają procesowi gojenia.

Objawy:

taki kichają pióra, mają słaby apetyt, wymioty, obrzęk szyi, trudności w oddychaniu, często wpołączeniu z biegunką

Dawkowanie:

Dawka pokarmu: Dla ptaków ogólnie: 5g./ 500g. Z jedzenia, dwa razy dziennie w ciągu 5 do 7 dni.

Dawka wody : Dla ptaków ogólnie: 5g. / 1l wody. Wody, dwa razy dziennie, 5 do 7 dni. Przed użyciem płyn należy wstrząsnąć !

Profilaktycznie: Zabezpieczenie swojemu ptakowi kwas cytrynowy 5 ml na 1 l wody dziennie. W komplecie zawarta miarka 1+5g.

Stir well before use!

Skład: 200.000 i.u. Nystatine per gram. Inactive ingredients q.s. to 100 g.

100 g PROSZEK

Dawkowanie:

Lecznico: 1 tabl. na gołębia (400-500g. Masy ciała) w ciągu 3-5 kolejnych dni lub z recepty weterynara.

Skład: Ketoconazole 75 mg/g

50 TABLETKI