



Fungi-Stop

Indikacije:

Važno za odgajivače je da razumeju da neke vrste gljivica vole da se razvijaju na semenima i hrani. Loša higijena u golubarnicima takođe dovodi do razvitka ovog problema. Najzdravije ptice neće biti zahvaćene, dok stare, bolesne i ptice opšteg lošeg stanja će imati problema. Sekundarna infekcija ovog tipa će usporiti oporavak i uticati na imunitet vaše ptice.

Simptomi:

Ptice čupaju sebi perje, slab apetit, povraćanje, problemi pri disanju, otekla guša. često kombinovani sa dijarejom.

Doziranje:

Doza kroz hranu: generalna doza: 5g na 500g hrane, 2x dnevno, 5 do 7 dana u kontinuitetu.

Doza kroz vodu: generalna doza: 5g na 1L pijaće vode, 2x dnevno, 5 do 7 dana u kontinuitetu.

Dobro promešati pre upotrebe!

Za prevenciju omogućite vašim pticama da konzumiraju limunsku kiselinu, 5ml na 1L pijaće vode, na dnevnom nivou.

Merica 1+5 g je uključena.



Saveti kako upotrebljavati:

- Stavite bolesnu pticu u karantin.
- Tretirajte sve vaše ptice, ne samo bolesne.
- Pomešajte potrebnu dozu kroz vodu ili hranu za jedan dan konzumiranja, ne za više, zbog svežine rastvora.
- Osigurajte da pticama bude dostupna samo voda koja sadrži lek tokom tretmana.
- Posle tretmana Fungi-Stopom, omogućite vašoj ptici dozu Multivitamina (dan posle zadnjeg dana upotrebe leka)
- Svake nedelje upotrebljavajte Multivitamin posle lečenja.
- Dezinfikujte golubarnik ili mesto gde su ptice.
- Ne upotrebljavajte lek na dan pakovanja ili dan ispred trke.

Napomena: Pročitajte pre upotrebe.

- Čuvati na suvom, tamnom mestu, van domašaja Sunčevih zraka, na temperaturi od 0-30 stepeni.
- Rok trajanja posle otvaranja poklopca: 1 godina.
- Datum proizvodnje i isteka je utisnut na pakovanju.
- Izbegavajte kontakt rukama sa lekom..
- Čuvati van domašaja dece.
- Interakcija: nije poznata. Kontra indikacije: predoziranje.
- Samo za životinjsku upotrebu. Ne za ljude i životinje koje su za prehranu ljudi.
- Odlazite prazna pakovanja u za na to predviđena mesta.

Sastav:

200.000 i.u. Nystatine-a po gramu. Neaktivni sastojci q.s. do 100 g.