



Ronidazole 10%

Indikacije:

Trihomonijaza, Heksamitioza. Ronidazol 10% je proizvod koji je specijalizovan u borbi protiv infekcija prouzrokovanih Trihomonom i Heksamitiom. Tokom takmičarske sezone, NEOPHODNO je čišćenje vaših ptica. Mlade ptice sa ozbiljnim intestinalnim infekcijama prouzrokovanim heksamitijom su veoma podložne infekcijama E-Koli.

Simptomi:

Gubitak kondicije i snage, loše varenje, loš izmet, zapaljenje sluzokože, komplikacije sa ornitozom, bele ka žućkastim fleke unutar kljuna.

Doziranje:

Prevenција: 2g na 2L pijaće vode, 1 ili 2 dana u nizu, na svake 2 nedelje, poželjno na dan posle trke početi.

Kao tretman tokom takmičarske sezone i van: 2g na 2L pijaće vode, 5-7 dana u kontinuitetu.

Upotreba leka se može ponoviti posle nekoliko dana ako je neophodno.

Dobro promešati pre upotrebe.

Ronidazol je prah rastvorljiv u vodi, ali se takođe može davati kroz hranu.

Merica 1+5 g je uključena.



Saveti kako upotrebljavati:

- Stavite bolesnu pticu u karantin.
- Tretirajte sve vaše ptice, ne samo bolesne.
- Pomešajte potrebnu dozu kroz vodu ili hranu za jedan dan konzumiranja, ne za više, zbog svežine rastvora.
- Osigurajte da pticama bude dostupna samo voda koja sadrži lek tokom tretmana.
- Posle tretmana Rondazolom, omogućite vašoj ptici dozu Multivitamina (dan posle zadnjeg dana upotrebe leka)
- Svake nedelje upotrebljavajte Multivitamin posle lečenja.
- Dezinfikujte golubarnik ili mesto gde su ptice.
- Ne upotrebljavajte lek na dan pakovanja ili dan ispred trke.

Napomena: Pročitajte pre upotrebe.

- Čuvati na suvom, tamnom mestu, vam domašaja Sunčevih zraka, na temperaturi od 0-30 stepeni.
- Rok trajanja posle otvaranja poklopca: 1 godina.
- Datum proizvodnje i isteka je utisnut na pakovanju.
- Izbegavajte kontant rukama sa lekom..
- Čuvati van domašaja dece.
- Interakcija: nije poznata. Kontra indikacije: predoziranje.
- Samo za životinjsku upotrebu. Ne za ljude i životinje koje su za prehranu ljudi.
- Odlazite prazna pakovanja u za na to predviđena mesta.

Sastav:

Ronidazol 10%, neaktivni sastojci q.s. do 100 g.