



Respiratory Broncho Mix 4 in 1

Indikacije:

Sistem organa za disanje može biti inficiran Hlamidijom, Mikoplazmom, bakterijama (posebno E-Koli), gljivicama i virusima. Baš zbog tih razloga, ovaj miks sadrži više aktivnih sastojaka.

Simptomi:

Kijanje, izlučevine iz očiju i nosa, otekline nozdrve i oko njih oblasti, zevanje, ljigav zeleni izmet, zevanje ptice, izvijanje vrata i gutanje.

Doziranje:

Prevenција: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 1 ili 2 dana u nizu, na svake 2 nedelje, poželjno na dan posle trke početi.

Kao tretman: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 5-7 dana u kontinuitetu.

Upotreba leka se može ponoviti posle nekoliko dana ako je neophodno.

Dobro promešati pre upotrebe.

Respiratory Broncho Mix je prah rastvorljiv u vodi, ali se takođe može davati kroz hranu.

Merica 1+5 g je uključena.



Saveti kako upotrebljavati:

- Stavite bolesnu pticu u karantin.
- Tretirajte sve vaše ptice, ne samo bolesne.
- Pomešajte potrebnu dozu kroz vodu ili hranu za jedan dan konzumiranja, ne za više, zbog svežine rastvora.
- Osigurajte da pticama bude dostupna samo voda koja sadrži lek tokom tretmana.
- Posle tretmana Broncho Mixom, omogućite vašoj ptici dozu Multivitamina (dan posle zadnjeg dana upotrebe leka)
- Svake nedelje upotrebljavajte Multivitamin posle lečenja.
- Dezinfikujte golubarnik ili mesto gde su ptice.
- Ne upotrebljavajte lek na dan pakovanja ili dan ispred trke.

Napomena: Pročitajte pre upotrebe.

- Čuvati na suvom, tamnom mestu, van domašaja Sunčevih zraka, na temperaturi od 0-30 stepeni.
- Rok trajanja posle otvaranja poklopca: 1 godina.
- Datum proizvodnje i isteka je utisnut na pakovanju.
- Izbegavajte kontakt rukama sa lekom.
- Čuvati van domašaja dece.
- Interakcija: nije poznata. Kontra indikacije: upotreba zajedno sa Bromheksinom i predoziranje.
- Samo za životinjsku upotrebu. Ne za ljude i životinje koje su za prehranu ljudi.
- Odlazite prazna pakovanja u za na to predviđena mesta.

Sastav:

Eritromicin tiocinat 3.5%, neomycin sulfat: 1.0%, streptomycin sulfat: 3.5%, Futaltadon HCl 6.0%, Oksitetraciklin HCl 5.0%, vitamini, neaktivni sastojci q.s. do 100 g.