



## Coli Stop

**Extra  
Strong**

*E-Coli( кишечная палочка), патифи, стрептококки, стафилококки и бактериальные инфекции в целом*

### Симптомы:

Потеря аппетита, ,отек шеи, потеря веса, рвота, коричнево-зеленые водянистые или слизистые выделения, внезапная смерть.

#### Дозировка:

**Профилактически:** 1 мерная ложка (= 5 г) на 2 литра питьевой воды в течение 1 или 2 дней каждые 2 недели, желательно начиная со дня после гонки.

**В качестве лечения:** 1 мерная ложка (= 5 г) на 2 литра питьевой воды в течение 5-7 дней.

Это лечение может быть повторено при необходимости через несколько дней.

Coli Stop - это водорастворимый порошок, который также можно давать с кормом.

**Содержит:** Streptomycine Sulfate 13,9%, Neomycine Sulfate 4%, Colistine Sulfate 2%. Inactive ingredients q.s. to 100 g.

## 100 г ПОРОШОК

## 50 ТАБЛЕТКИ

#### Дозировка:

**Профилактически:** 1 таблетка на голубя (400-500 г массы тела) в течение 1-2 дней.

**Для лечения :** 1 таблетка на голубя (400-500 г массы тела) в течение 3-5 дней или по назначению ветеринару.

**Содержит:** Neomycine sulfate 5,0 mg/g ; Streptomycine sulfate 17,4 mg/g ; Colistine sulfate 2,5 mg/g