



Fungi Stop

Для любителей голубей важно знать, что некоторые виды грибов растут на зернах. Плохая гигиена также может распространять дрожжи. Большинство здоровых голубей не будут заражены, грибковые инфекции развиваются у пожилых, больных и стрессовых птиц. Эти вторичные инфекции вызывают стресс у уже перегруженной иммунной системы и препятствуют восстановлению.

Симптомы:

Птицы отрывают перья, слабый аппетит, рвота, припухлая шея, затрудненное дыхание, часто в сочетании с диареей

100 g ПОРОШОК

Дозировка:

Доза пищи: для всех птиц: 5 г / 500 г пищи, два раза в день, от 5 до 7 дней.

Доза питьевой воды: для всех птиц: 5 г / 1 л питьевой воды, два раза в день, от 5 до 7 дней.

Хорошо перемешайте перед применением!

В целях профилактики давайте птицам лимонную кислоту по 5 мл на 1 литр питьевой воды в день.

СОДЕРЖИТ: 200.000 м.е. Нистатин на грамм. Неактивные ингредиенты до 100 г.

50 ТАБЛЕТКИ

Дозировка:

Лечебное средство: 1 таблетка на голубя (400-500 г массы тела) в течение 3-5 дней или по ветеринарному назначению

СОДЕРЖИТ: Кетоконазол 75 мг / г